

تحقق من أن المميز المختصر  $\Delta'$  يساوي  $(\sqrt{3}j^2)^2$

ب. حل المعادلة:  $(E_1)$

ج. أكتب حل المعادلة  $(E_1)$  على الشكل المتلثي وعلى الشكل  $\lambda i$  و

$\lambda ij$  حيث:  $(\lambda \in \mathbb{R})$

2. أ. أنشر  $P(z)$ .

ب. استنتج حلول المعادلة:

$$(E): (z \in \mathbb{C}; z^3 + 8i = 0)$$

3. لتكن  $a$  و  $b$  و  $c$  هي حلول المعادلة  $(E)$  بحيث:

$$\operatorname{Re}(a) = 0 \quad \text{و} \quad \operatorname{Re}(b) < 0 \quad \text{و} \quad \operatorname{Re}(c) > 0$$

أ. تحقق من أن:  $a + bj + cj^2 = 0$

ب. في المستوى المنسوب الى معلم متعامد ممنظم ومباشر

$(O, \vec{u}, \vec{v})$ ; تعتبر على التوالي النقط  $A$  و  $B$  و  $C$  التي ألقاها

على التوالي هي:  $a$  و  $b$  و  $c$ .

بين أن  $ABC$  مثلث متساوي الأضلاع.

**التمرين 4:** نضع:

$$\forall z \in \mathbb{C} - \{i\} : P(z) = \frac{2z - i}{z - i}$$

$$z = x + iy \quad / \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2 \quad \text{و}$$

1. أ. حدد  $\operatorname{Re}(P(z))$  بدلالة  $x$  و  $y$ , حيث:

$\operatorname{Re}(P(z))$  هو الجزء الحقيقي للعدد العقدي  $P(z)$ .

ب. المستوى العقدي  $\rho$  منسوب الى معلم متعامد ممنظم مباشر

$(O, \vec{u}, \vec{v})$ . حدد  $(\Gamma)$  مجموعة النقط  $M(z)$  من  $\rho$  التي

تحقق:  $\operatorname{Re}(P(z)) = 0$

أ. بين أن:

$$\forall z \in \mathbb{C} - \{i\}; [P(z) = z] \Leftrightarrow [z^2 - (2+i)z + i = 0]$$

ب. حل المعادلة:  $z^2 - (2+i)z + i = 0$ ;  $z \in \mathbb{C}$ ;

ج. ليكن  $\theta \in ]0, \frac{\pi}{2}[$ . أكتب على الشكل المتلثي كلا من العددين:

$$1 + \cos(\theta) + i \sin(\theta)$$

$$\text{و} \quad 1 - \cos(\theta) + i \sin(\theta)$$

د. استنتج الشكل المتلثي لكل من العددين:

$$\frac{2 - \sqrt{3} + i}{2} \quad \text{و} \quad \frac{2 + \sqrt{3} + i}{2}$$

**التمرين 5:** لتكن  $(S_n)_{n \geq 2}$  المتتالية العددية حيث:

$$S_n = \sum_{k=0}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)$$

1. بين بالترجع: **صيغة موافر** Formule de Moivre

$$\forall \theta \in \mathbb{R}; \forall n \in \mathbb{N};$$

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$$

$$(2) \text{ نضع: } \forall n \geq 2 : Z_n = \cos\left(\frac{\pi}{n}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{n}\right)$$

**التمرين 1:**

**I** نعتبر المعادلة:

$$(E): z \in \mathbb{C}; z^3 - 4(1-i)z^2 + 16(1-i)z + 64i = 0$$

1. تحقق من أن العدد  $-4i$  حل للمعادلة  $(E)$ .

2. حل المعادلة  $(E)$ .

3. نعتبر العدد  $z_k$  بحيث:  $z_k = \left(\frac{1+i\sqrt{3}}{4}\right)^k - \left(\frac{1-i\sqrt{3}}{4}\right)^k$ ;  $k \in \mathbb{Z}$  و

أثبت أن:  $z_k = \frac{i}{2^{k-1}} \sin\left(\frac{k\pi}{3}\right)$ ; ثم استنتج أن:  $z_{2001} = 0$ .

**II** المستوى العقدي منسوب إلى معلم متعامد ممنظم  $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$ .

لتكن  $A$  صورة العدد  $z_A$  والنقطة  $B$  صورة العدد  $z_B$  بحيث:

$$z_B = 2 - 2i\sqrt{3} \quad \text{و} \quad z_A = 2 + 2i\sqrt{3}$$

1. أنشئ النقطة  $C$  صورة العدد  $z_C$  بحيث:  $z_C = \frac{3}{2}z_A + z_B$ .

2. حدد عمدة للعدد  $\frac{z_B - z_C}{z_A - z_C}$  واستنتج طبيعة المثلث  $ABC$ .

**التمرين 2:** نضع  $\forall z \in \mathbb{C}^*: P(z) = z + \frac{4}{z}$

1. حل في  $\mathbb{C}$  المعادلة:  $(E): P(z) = -2$

2. نرسم  $z_1$  و  $z_2$  لحلي المعادلة  $(E)$ .

أ. أكتب  $z_1$  و  $z_2$  على الشكل المتلثي.

ب. بين أن:  $z_1^{2001} + z_2^{2001} = 2^{2002}$

3. المستوى العقدي منسوب إلى معلم متعامد ممنظم  $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$ .

أ. لتكن النقط  $A(\alpha)$  و  $B(-1 + \sqrt{3})$  و  $C(-1 - i\sqrt{3})$

حيث  $\alpha$  عدد حقيقي موجب. حدد قيمة  $\alpha$  لكي يكون المثلث  $ABC$  متساوي الأضلاع.

ب. بين أن:  $\forall z \in \mathbb{C}^*: P(z) = \overline{P(z)} \Leftrightarrow (z - \bar{z})(z\bar{z} - 4) = 0$

ج. استنتج  $(\Gamma)$  مجموعة النقط  $M(z)$  التي من أجلها يكون  $P(z)$

عددا حقيقيا.

د. تحقق من أن النقط  $A$  و  $B$  و  $C$  تنتمي الى المجموعة  $(\Gamma)$ .

**التمرين 3:**

**A** نضع:  $j = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$   $j$  esl l'entier de JACOBI

(  $j$  هو جذر من الرتبة الثالثة للوحدة:  $j^3 = 1$  )

1. تحقق من أن:  $j^2 = \bar{j}$  و أن  $1 + j + j^2 = 0$ .

2. أكتب على الشكل المتلثي العددين العقديين  $2i$  و  $2ij$ .

**B** نعتبر  $P$  و  $Q$  التطبيقين من  $\mathbb{C}$  نحو  $\mathbb{C}$  المعرفين كما يلي:

$$Q(z) = z^2 + 2ij^2z - 4j \quad \text{و} \quad P(z) = (z - 2i\bar{j})Q(z)$$

1. أ. نعتبر المعادلة:  $(E_1): (z \in \mathbb{C}; Q(z) = 0)$

## التمرين 8 : الحذور من الرتبة الخامسة للوحدة .

### إنشاء الخمس المنتظم .

(Pentagone - régulier)

$$z_0 = \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) + i \sin\left(\frac{2\pi}{5}\right) \quad \text{ليكن}$$

1. نضع :  $\alpha = z_0 + z_0^4$  و  $\beta = z_0^2 + z_0^3$

أ. بين أن :  $1 + z_0 + z_0^2 + z_0^3 + z_0^4 = 0$

و استنتج أن  $\alpha$  و  $\beta$  هما حلا للمعادلة :

$$(*) : X^2 + X - 1 = 0$$

ب. أوجد  $\alpha$  بدلالة  $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$  .

ج. حل المعادلة (\*) واستنتج قيمة  $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$  .

2. لتكن  $A_0$  و  $A_1$  و  $A_2$  و  $A_3$  و  $A_4$  النقاط التي أحاقها على التوالي

هي 1 و  $z_0$  و  $z_0^2$  و  $z_0^3$  و  $z_0^4$  في المستوى المنسوب الى معلم

متعامد ممنظم ومباشر  $(O, \vec{u}, \vec{v})$  .

أ. لتكن  $H$  نقطة تقاطع المستقيم  $(A_1A_4)$  و المحور  $(O, \vec{u})$  .

$$\overline{OH} = \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) \quad \text{بين أن :}$$

ب. الدائرة التي مركزها النقطة  $\Omega$  ، ذات اللق  $-\frac{1}{2}$  ، والمارة من

النقطة  $B$  ، ذات اللق  $i$  ، تقطع المحور  $(O, \vec{u})$  في نقطتين  $M$

و  $N$  (نسمي النقطة التي أفصولها موجب)

بين أن :  $\overline{OM} = \alpha$  و  $\overline{ON} = \beta$

و أن  $H$  منتصف القطعة  $[OM]$  .

ج. استنتج إنشاء لمخمس منتظم مركزه  $O$  ومارا من نقطة  $A_0$  .

التمرين 9 : نعتبر الدالة  $P$  المعرفة على  $\mathbb{R}$  بما يلي :

$$\forall x \in \mathbb{R} : P(x) = \frac{1}{2i} \left[ \left(1 + i \frac{x}{8}\right)^8 - \left(1 - i \frac{x}{8}\right)^8 \right]$$

1. بين أن  $P$  دالة حدودية معاملات أعداد حقيقية . ثم حدد درجتها وأدرس زوجيتها .

2. أ. حل في  $\mathbb{C}$  المعادلة  $z^8 = 1$  ، نعطي الحلول على شكلها الجبري .

ب. حل المعادلة :  $P(x) = 0$  :  $x \in \mathbb{R}$

التمرين 10 : نعتبر الدالة الحدودية  $P$  من  $\mathbb{C}$  الى  $\mathbb{C}$  المعرفة

$$P(z) = (z - i)^n - (i - \bar{z})^n \quad \text{بما يلي :}$$

حيث  $n \in \mathbb{N}^*$  و  $\bar{z}$  مرافق العدد العقدي  $z$  .

1. لتكن  $A$  و  $M$  و  $M'$  صور الأعداد  $i$  و  $z$  و  $\bar{z}$  على التوالي في المستوى العقدي .

أ. بين أنه إذا كان  $z$  حلا للمعادلة  $P(z) = 0$  فإن  $AM = AM'$

ب. استنتج أنه إذا كان  $z$  حلا للمعادلة  $P(z) = 0$  فإن  $z$  عدد

حقيقي .

2. حل المعادلة  $P(z) = 0$  .

أحسب المجموع :  $\sum_{k=0}^{n-1} Z_n^k$  لكل  $n \geq 2$  .

$$3. \text{ بين أن : } \forall n \geq 2 : \frac{2}{1 - Z_n} = 1 + i \frac{1}{\tan\left(\frac{\pi}{2n}\right)}$$

$$4. \text{ استنتج أن : } \forall n \geq 2 : S_n = \frac{1}{\tan\left(\frac{\pi}{2n}\right)}$$

5. أحسب  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n}$  .

التمرين 6 : في المستوى العقدي المنسوب الى معلم متعامد ممنظم ومباشر  $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$  ؛ نعتبر النقط  $A$  و  $B$  و  $C$  التي أحاقها على

التوالي هي  $a$  و  $b$  و  $c$  ؛ ونعتبر  $\vec{u}_1$  و  $\vec{u}_2$  متجهتين غير منعدمتين

حيث :  $\text{Aff}(\vec{u}_1) = z_1$  و  $\text{Aff}(\vec{u}_2) = z_2$

1. بين أن :  $\vec{u}_1$  و  $\vec{u}_2$  مستقيمتان  $\Leftrightarrow z_1 \bar{z}_2 - \bar{z}_1 z_2 = 0$

2. بين أن :  $\vec{u}_1 \perp \vec{u}_2 \Leftrightarrow z_1 \bar{z}_2 + \bar{z}_1 z_2 = 0$

3. بين أن :  $\overline{u_1 u_2} = \text{Re}(z_1 \bar{z}_2) = \frac{1}{2}(z_1 \bar{z}_2 + \bar{z}_1 z_2)$

4. ليكن  $j = -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}$  و  $\Omega$  نقطة لحقها  $\omega$  .

أ. ليكن  $R$  الدوران الذي مركزه  $\Omega$  وزاويته  $\frac{\pi}{3}$  .

بين أنه إذا كانت النقطة  $M'$  التي لحقها  $z'$  ، هي صورة النقطة

$M$  التي لحقها  $z$  ، بالدوران  $R$  ، فإن :

$$z' = -j^2 z - j \omega$$

ب) استنتج أن :  $ABC$  مثلث متساوي الأضلاع

$$\Leftrightarrow a + bj + cj^2 = 0 \quad \text{أو} \quad a + bj^2 + cj = 0$$

$$\Leftrightarrow a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca = 0$$

$$\Leftrightarrow (a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 = 0$$

ج. حدد الأعداد العقدية  $z$  التي من أجلها يكون المثلث  $ABC$

متساوي الأضلاع ، حيث :  $a = i$  و  $b = z$  و  $c = iz$  .

5. بين أن : النقط  $A$  و  $B$  و  $C$  مستقيمية

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ \bar{a} & \bar{b} & \bar{c} \end{vmatrix} = 0$$

التمرين 7 :

1. بين أن :  $\forall x \in \mathbb{R} : e^{2ix} - 1 = 2i \sin(x) e^{ix}$

2. حل في  $\mathbb{C}$  المعادلة التالية :

$$(Z + 1)^n = e^{2in a} \quad (n \in \mathbb{N}^* \text{ و } a \in \mathbb{R})$$

3. نضع :  $\forall n \in \mathbb{N}^* : P_n = \prod_{k=0}^{n-1} \sin\left(a + \frac{k\pi}{n}\right)$

أثبت أن :  $P_n = \frac{\sin(na)}{2^{n-1}}$

**التمرين 11 :** يكن  $f$  التطبيق من  $\mathbb{C} - \{i\}$  نحو  $\mathbb{C} - \{i\}$

$$f(z) = \frac{iz}{z-i} \quad \text{المعرف بما يلي :}$$

في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم  $(O, \vec{u}, \vec{v})$ ؛ نعتبر

النقطة  $B$  ذات اللوح  $i$  ؛ ونربط كل نقطة  $M$  بلحقتها  $z$  .

1. حدد المجموعتين :  $(E_1) = \{M(z) / f(z) \in \mathbb{R}\}$

و  $(E_2) = \{M(z) / f(z) \in i\mathbb{R}\}$

2. حل في  $\mathbb{C} - \{i\}$  المعادلة :  $f(z) = -2z + 1$  .

3. ليكن  $z \in \mathbb{C} - \{i\}$  . نعتبر  $r$  معيار  $z - i$  و  $\alpha$  قياسا لعمدة  $z - i$  .

أ. أكتب  $f(z) - i$  على الشكل المثلثي .

ب. حدد  $(C)$  , مجموعة النقط  $M(z)$  بحيث :  $|f(z) - i| = \sqrt{2}$

ج. حدد  $(D)$  , مجموعة النقط  $M(z)$  بحيث يكون  $\frac{\pi}{4}$  قياسا لعمدة  $f(z) - i$  .

د. حدد  $z_0$  بحيث  $f(z_0) = 1 + 2i$  .

لتكن  $A$  النقطة ذات اللوح  $z_0$  .

تحقق من أن  $A$  تنتمي إلى  $(C)$  و  $(D)$  .

أرسم  $(C)$  و  $(D)$  .

**التمرين 12 :** في المستوى الأفليدي  $\mathcal{P}$  المنسوب إلى معلم متعامد

ممنظم مباشر  $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$  , نعتبر النقطتين  $A(i)$  و  $A'(-i)$  وليكن  $f$

التطبيق من  $\mathbb{C} - \{i\}$  نحو  $\mathbb{C}$  والمعرف بما يلي :  $f(z) = \frac{\bar{z}(z-i)}{z+i}$

وليكن  $F$  التطبيق من  $\mathcal{P} - \{A\}$  نحو  $\mathcal{P}$  الذي يربط كل نقطة

$M(z)$  بالنقطة  $M'(z')$  حيث :  $z' = f(z)$  .

1. أثبت أنه إذا كان  $z \neq 0$  و  $z' \neq 0$  فإن :

$$\arg(z') \equiv -\arg(z) + 2\arg(z-i) [2\pi] \text{ و } |z| = |z'|$$

( لاحظ أن  $z - i$  و  $\bar{z} + i$  مترافقان )

ب. بين أنه إذا كان  $|z| = 1$  فإن  $f(z) = -i$  .

2. أ. حدد مجموعة النقط الصامدة بالتطبيق  $F$  .

ب. ماهي مجموعة النقط  $M(z)$  بحيث تكون  $f(z)$  على شكل

$ai$  مع  $a$  عنصر من  $\mathbb{R}$  ؟

$$3. \text{ أ. أثبت أن : } z' + i = \frac{\bar{z}\bar{z} - 1}{|\bar{z} + i|^2} (z - i)$$

$$\text{و أن : } z' - z = \frac{-i(z + \bar{z})}{|\bar{z} + i|^2} (z - i)$$

ب. استنتج أن المتجهين  $\overrightarrow{AM}$  و  $\overrightarrow{A'M'}$  مستقيمان .

وأن  $\overrightarrow{AM}$  و  $\overrightarrow{MM'}$  متعامدان .

ج. أعط طريقة للإنشاء الهندسي لصورة  $M$  بالتطبيق  $F$  .

**التمرين 13 :**  $\alpha$  عدد حقيقي ينتمي إلى المجال  $[0, 2\pi[$  .

1. أ. حل في  $\mathbb{C}$  المعادلة :  $z^2 + i(2^{\alpha+1} \cdot \sin(\alpha))z - 2^{2\alpha} = 0$

ب. أكتب الحلين على شكلهما المثلثي .

2. المستوى العقدي منسوب إلى معلم متعامد ممنظم  $(O, \vec{u}, \vec{v})$  .

نعتبر  $A$  و  $B$  صورتنا حلي المعادلة السابقة .

حدد  $\alpha$  لكي يكون المثلث  $OAB$  متساوي الأضلاع .

**التمرين 14 :** ليكن  $\theta$  عددا حقيقيا . لكل  $z$  من  $\mathbb{C}$  . نضع :

$$P(z) = z^3 + (1 + 3ie^{i\theta})z^2 + (1 + i(1 + 3e^{i\theta}))z + (3i - 3)e^{i\theta}$$

1. بين أن  $z_1 = -3ie^{i\theta}$  حل للمعادلة :  $P(z) = 0$  ;  $z \in \mathbb{C}$  ;  $(E)$  :

أ. حدد العددين العقديين  $a$  و  $b$  بحيث :

$$P(z) = (z + 3ie^{i\theta})(z^2 + az + b) \quad \text{لكل } z \text{ من } \mathbb{C} .$$

ب. ليكن  $z_2$  و  $z_3$  الحلين الآخرين للمعادلة  $(E)$  .

حدد  $z_2$  و  $z_3$  (  $z_2$  هو الحل التخيلي الصرف )

3. أ) أكتب  $z_1$  و  $z_2$  و  $z_3$  على الشكل المثلثي .

ب) نضع :  $\theta = \frac{\pi}{10}$  . حدد الشكل الجبري للعدد العقدي  $\alpha$

$$\text{حيث : } \alpha = z_1^5 + z_2^5 + z_3^5$$

**التمرين 15 :** لكل عدد عقدي  $z$  ؛ نضع :

$$P(z) = 2iz^3 + 2(2-i)z^2 - (3+2i)z + i$$

1. أ. أوجد العدد الحقيقي  $\alpha$  بحيث :  $P(i\alpha) = 0$

ب. تحقق أن :  $P(z) = (z - \alpha i)Q(z)$

$$Q(z) = ((1+i)z - i)^2 \quad \text{حيث :}$$

2. نعتبر المعادلة :

$$(E) : z \in \mathbb{C} : z^2 - (m - i(m+1))z - im^2 - m = 0$$

حيث  $m$  بارامتر حقيقي .

أ. بين أن مميز المعادلة  $(E)$  هو  $Q(m)$  .

ب. حدد الجدرين  $z'$  و  $z''$  للمعادلة  $(E)$  علما أن  $|z'| = |m|$

3. نضع  $m = 2 \cos(\theta) + i \sin(\theta)$  حيث  $\theta \in [0, \pi]$  ،

ونعتبر المجموعة :  $(C) = \{M(z'') / \theta \in [0, \pi]\}$

أ. بين أن  $(C)$  جزء من إهليلج ينبغي تحديد معادلته ورؤوسه في

المعلم  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  .

ب. أنشئ  $(C)$  في المعلم  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  .

$$4. \text{ نضع : } m = \frac{2}{\cos(\theta)} + 3i \tan(\theta) \quad \text{حيث } \theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$$

ونعتبر المجموعة :  $(C') = \left\{M(z') / \theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]\right\}$

أ. بين أن  $(C')$  جزء من هذلول  $(H)$  ينبغي تحديد معادلته ورؤوسه

ومقاربيه في المعلم  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  .

ب. أنشئ  $(H)$  و  $(C')$  في المعلم  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  .

**التمرين 16 :**

لكل  $z$  من المجموعة  $\mathbb{C}$  نضع :

$$t(z) = z^2 - \sqrt{2}z + i\sqrt{3}$$

1. نعتبر في  $\mathbb{C}$  المعادلة التالية :  $t(z) = -i\sqrt{3}$  ؛

- أ. وليكن  $z_1$  و  $z_2$  حلها بحيث  $\text{Im}(z_1) < 0$  .  
 ب. أكتب  $z_1$  و  $z_2$  على الشكل المثالي .

ج. حدد مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية  $n$  بحيث :  $\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^n \in \mathbb{R}$

2. المستوى العقدي  $(\rho)$  منسوب إلى معلم متعامد ممنظم مباشر  $(O, \vec{u}, \vec{v})$  ؛

أ. نعتبر المجموعة :  $E = \{M(z)/t(z) \in i\mathbb{R}\}$  .  
 بين أن  $E$  هذلول يتم تحديد مركزه ورأسيه ومقاربيه في المعلم  $(O, \vec{u}, \vec{v})$  .

ب. لتكن  $(C)$  الدائرة التي مركزها النقطة  $\Omega$  ذات اللق  $\frac{\sqrt{2}}{2}$

وشعاعها  $r = \frac{\sqrt{2}}{2}$  و  $M$  النقطة ذات اللق  $z$  و  $M'$  النقطة

ذات اللق  $t(z)$  . بين أنه إذا كانت  $M$  تنتمي إلى الدائرة  $(C)$  فإن  $M'$  تنتمي إلى دائرة  $(C')$  يتم تحديد مركزها وشعاعها .

ج. أنشئ  $E$  و  $(C)$  و  $(C')$  في المعلم  $(O, \vec{u}, \vec{v})$  .

**التمرين 17 :** ليكن  $\theta$  عددا حقيقيا بحيث :  $0 \leq \theta < 2\pi$  .  
 نضع :  $p = 5 \cos(\theta) + 3i \sin(\theta)$

نعتبر في  $\mathbb{C}$  المعادلة  $(E)$  التالية :  $z^2 - 2pz + 16 = 0$  .  
 1. أ. تحقق أن :  $p^2 - (3 \cos(\theta) + 5i \sin(\theta))^2 = 16$  .  
 ب. حل في  $\mathbb{C}$  المعادلة  $(E)$  .

نرمز ب  $z_1$  و  $z_2$  لحلي المعادلة  $(E)$  بحيث :  $|z_1| < |z_2|$  .  
 2. المستوى العقدي  $(\rho)$  منسوب إلى معلم متعامد ممنظم مباشر

$(O, \vec{u}, \vec{v})$  ؛ نعتبر النقطتين  $M_1$  و  $M_2$  اللتين لحاقهما على التوالي هما  $z_1$  و  $z_2$  .

أ. بين أنه عندما يتغير العدد  $\theta$  في المجال  $[0, 2\pi[$ ، فإن النقطة  $M_1$  تتغير على دائرة  $(C)$  ينبغي تحديد معادلتها لها .

ب. لتكن  $P$  منتصف القطعة  $[M_1M_2]$  . ولتكن  $(\Gamma)$  مجموعة النقط  $P$  عندما يتغير العدد  $\theta$  في المجال  $[0, 2\pi[$  .

بين أن  $(\Gamma)$  إهليلج بؤرتاه هما النقطتان  $F$  و  $F'$  اللتين لحاقهما على التوالي هما  $4$  و  $-4$  .

3. أ. بين أنه لكل عددين عقديين  $a$  و  $b$  من  $\mathbb{C} - \{4\}$ ، لدينا :

$$\left(\frac{b+4}{b-4} = -\frac{a+4}{a-4}\right) \Leftrightarrow (ab=16)$$

ب. استنتج أن :  $\frac{z_2+4}{z_2-4} = -\frac{z_1+4}{z_1-4}$

ج. بين أن :  $[2\pi] \equiv \overline{(M_1F, M_1F')} \equiv \pi + \overline{(M_2F, M_2F')}$

4. أ. بين أن معادلة المماس  $(T)$  للمنحنى  $(\Gamma)$  في النقطة  $P$  هي :

$$3x \cos(\theta) + 5y \sin(\theta) = 15$$

ب. بين أن المماس  $(T)$  عمودي على المستقيم  $(M_1M_2)$  .

### التمرين 18 :

1. حل في  $\mathbb{C}$ ، المعادلة :  $z^2 + z + 1 = 0$

2. لكل عدد عقدي  $z$  حيث :  $z = e^{i\theta} = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$

مع  $-\pi \leq \theta \leq \pi$  و  $\theta \neq \frac{2\pi}{3}$  و  $\theta \neq -\frac{2\pi}{3}$  ؛

نضع :  $z' = \frac{1}{z^2 + z + 1}$

أ. تحقق من أن :  $1 + z + z^2 = z(1 + z + \bar{z})$

ب. أحسب معيار وعمدة  $z'$  بدلالة  $\theta$  .

ج. نضع  $z' = x + iy$  حيث  $x$  و  $y$  عدنان حقيقيان .

بين أن :  $x^2 + y^2 = (1 - 2x)^2$

د. استنتج أن النقطة  $M$  ذات اللق  $z'$ ، تنتمي إلى هذلول يتم تحديد مركزه ورأسيه ومقاربيه .

**التمرين 19 :** المستوى العقدي منسوب إلى معلم متعامد ممنظم مباشر  $(O, \vec{u}, \vec{v})$  ؛ ليكن  $a$  عددا عقديا غير منعدم شكله الجبري هو :

$$a = \alpha + i\beta$$

1. لتكن  $(H)$  مجموعة النقط  $M$  التي لحقها  $z$  يحقق :

$$z^2 - (\bar{z})^2 = a^2 - (\bar{a})^2 \quad (\bar{u} \text{ هو مرافق العدد العقدي } u)$$

أ. حدد طبيعة  $(H)$  .

ب. أنشئ  $(H)$  في الحالة :  $a = 1 + i$

2. لتكن  $(C)$  مجموعة النقط  $M$  التي لحقها  $z$  يحقق :

$$(z-a)(\bar{z}-\bar{a}) = 4a\bar{a}$$

أ. حدد طبيعة  $(C)$  .

ب. أنشئ  $(C)$  في الحالة :  $a = 1 + i$

3. نعتبر في المجموعة  $\mathbb{C}$ ، النظمة التالية :

$$(S): \begin{cases} z^2 - (\bar{z})^2 = a^2 - (\bar{a})^2 \\ (z-a)(\bar{z}-\bar{a}) = 4a\bar{a} \end{cases} \quad \text{ونضع : } u = z - a$$

أ. بين أن النظمة  $(S)$  تكافئ النظمة :

$$(S'): \begin{cases} u\bar{u} = 4a\bar{a} \\ (u+2a)(u^3 - 8a(\bar{a})^2) = 0 \end{cases}$$

ب. نضع  $a = re^{i\theta}$  حيث  $r > 0$  و  $-\pi < \theta \leq \pi$  .

حدد ؛ بدلالة  $r$  و  $\theta$  ؛ ألقاق نقط تقاطع  $(C)$  و  $(H)$  .

ج. استنتج أن تقاطع  $(C)$  و  $(H)$  يتضمن ثلاث نقط هي رؤوس مثلث متساوي الأضلاع .

**التمرين 20 :** في المستوى العقدي المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم ؛ نعتبر النقط  $I$  و  $A$  و  $M$  و  $M'$  التي لحاقها على التوالي : 1 و 2 و  $z$  و  $z'$  حيث  $z'$  و  $z$  عدنان عقديان .

1. بين أن المخروطي (H) ؛ إذا المعادلة  $x^2 - y^2 - 2x = 0$  ؛ هذلول محدد رأسيه ومقاربيه .

2. بوضع :  $z = x + iy$  و  $z' = x' + iy'$  حيث  $x$  و  $y$  و  $x'$  و  $y'$  أعداد حقيقية ؛ أوجد بدلالة  $x$  و  $y$  و  $x'$  و  $y'$  الجزء الحقيقي للعدد :  $(z'-1)^2 + (z-1)^2 - 1$  .

3. نفترض أن :  $(z'-1)^2 + (z-1)^2 = 1$  بحيث :

$$z \notin \{0,1,2\} \quad \text{و} \quad z' \notin \{0,1,2\}$$

أ. بين أنه إذا كان  $M \in (H)$  فإن  $M'$  تنتمي إلى اتحاد مستقيمين يجب تحديد معادلة ديكارتية لكل منهما .

$$\text{ب. بين أن : } \overline{IM'^2} = \overline{OM} \times \overline{MA} \\ \text{و أن : } \overline{(OM, IM')} \equiv \overline{(IM', MA)} [2\pi]$$

ج. بين أن :

$$MA^2 + MO^2 + 2IM^2 = 2[z\bar{z} - (z+\bar{z}) + z'z' - (z'+\bar{z}') + 3]$$

د. بين أن :  $MA + MO = M'A + M'O$

**التمرين 21 :** نعتبر التطبيق  $f_a$  من  $\mathbb{C} - \{a\}$  نحو  $\mathbb{C} - \{a\}$

المعرف بما يلي :  $f_a(z) = \frac{az}{z-a}$  حيث  $a \in \mathbb{C}^*$  .

1. بين أن :  $f_a(z) \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow |z|^2 \operatorname{Re}(a) = |a|^2 \operatorname{Re}(z)$

2. ليكن  $z \in \mathbb{C} - \{a\}$  .

نضع :  $r = |z-a|$  و  $\arg(z-a) \equiv \theta [2\pi]$  .

أحسب  $|f_a(z) - a|$  بدلالة  $r$  و  $|a|$  ؛

وأحسب  $\arg(f_a(z) - a)$  بدلالة  $\theta$  و  $\arg(a)$  .

3. نضع في ما يلي :  $a = -1 + i$  و نعتبر في المستوى ( $\rho$ ) المنسوب

إلى معلم متعامد ممنظم مباشر  $(O, \vec{u}, \vec{v})$  ،

المجموعات :  $(C) = \{M(z) / |f_a(z) - a| = 2\}$

و  $(E) = \{M(z) / f_a(z) \in i\mathbb{R}\}$

و  $(D) = \left\{ M(z) / \arg(f_a(z) - a) \equiv \frac{3\pi}{4} [2\pi] \right\}$

أ. حدد كلا من  $(E)$  و  $(C)$  و بين أن  $(D)$  نصف مستقيم طرفه

$A(a)$  محروم من  $A(a)$  محددًا معادلة ديكارتية له .

ب. ليكن  $z_0$  عنصرًا من  $\mathbb{C} - \{a\}$  والنقطة  $B$  ذات اللق  $z_0$

بحيث  $B \in (D) \cap (C)$  .

أكتب  $f(z_0)$  على الشكل الجبري ثم استنتج  $z_0$  .

ج. أنشئ المجموعات  $(C)$  و  $(E)$  و  $(D)$  .

**التمرين 22 :** لتكن  $U = \{z \in \mathbb{C} / |z| = 1\}$

1. بين أن :  $-1 \leq \operatorname{Re}(z) \leq 1$  و  $-1 \leq \operatorname{Im}(z) \leq 1$   $\forall z \in \mathbb{C}$

2. ليكن  $(a, b) \in U^2$  .

أ. بين أن :  $\frac{(a+b)^2}{ab} = a\bar{b} + \bar{a}b + 2$

ب. استنتج أن :  $\frac{(a+b)^2}{ab}$  عدد حقيقي موجب .

3. ليكن  $z_1$  و  $z_2$  عددين عقديين غير منعدمين .

نعتبر في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم مباشر

$(O, \vec{u}, \vec{v})$  ، النقطتين  $M_1$  و  $M_2$  اللتين لحقاهما على التوالي هما

$z_1$  و  $z_2$  . وليكن  $t$  لحق النقطة  $G$  مرجح النظمة المترنة

نضع :  $a = \frac{z_1}{|z_1|}$  و  $b = \frac{z_2}{|z_2|}$  .  $\left\{ \left( M_1, \frac{1}{|z_1|} \right); \left( M_2, \frac{1}{|z_2|} \right) \right\}$

أ. بين أن :  $\frac{t^2}{z_1 z_2} = \frac{(a+b)^2}{ab} \times \frac{|z_1||z_2|}{(|z_1|+|z_2|)^2}$

ب. نفترض أن :  $a+b \neq 0$  .

بين أن المستقيم  $(OG)$  هو حامل منصف الزاوية الموجهة  $(\overline{OM_1}, \overline{OM_2})$

**تطبيق :** نعتبر النقطتين  $A$  و  $B$  اللتين لحقاهما على التوالي هما

$2+i$  و  $-2+11i$  . حدد معادلة ديكارتية لحامل

منصف الزاوية الموجهة  $(\overline{OA}, \overline{OB})$  .

**التمرين 23 :** المستوى العقدي منسوب إلى معلم متعامد ممنظم

مباشر  $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$  .

لكل  $z$  من  $\mathbb{C}$  ؛ نضع  $f(z) = z^2 - 2jz - 1$  حيث  $j = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}$

1. حل في  $\mathbb{C}$  المعادلة :  $f(z) = 0$  .

2. ليكن التطبيق :  $F : \rho \rightarrow \rho$

$$M(z) \mapsto M'(f(z))$$

ولتكن  $(C)$  الدائرة التي مركزها  $A(j)$  وشعاعها  $r$  و  $(D)$  المستقيم

الذي يمر من  $A$  ومعامله الموجه  $\tan(\theta)$  حيث  $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$  .

أ. تحقق من أن :  $\forall z \in \mathbb{C} : f(z) - j = (z-j)^2$

ب. حدد طبيعة صورة كل من المجموعتين  $(C)$  و  $(D)$  بالتطبيق  $F$  .

**التمرين 24 :** المستوى العقدي منسوب إلى معلم متعامد ممنظم

و مباشر  $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$  .

1. نعتبر التطبيق  $\varphi$  المعرف على المجموعة  $\mathbb{C}^*$  بما يلي :

$$\forall z \in \mathbb{C}^* : \varphi(z) = \frac{1}{2} \left( z + \frac{1}{z} \right)$$

أ. حل في  $\mathbb{C}$  المعادلة :  $\varphi(z) = i$  .

ب. نضع  $z = re^{i\theta}$  حيث :  $r > 0$  و  $0 \leq \theta < 2\pi$  .

عبر ؛ بدلالة  $r$  و  $\theta$  ؛ عن الجزء الحقيقي وعن الجزء التخيلي

للعدد العقدي  $\varphi(z)$  .

2. نعتبر التطبيق  $f$  من  $\rho^*$  نحو  $\rho$  الذي يربط كل نقطة  $M(z)$

بالنقطة  $M'(\varphi(z))$  . لتكن  $(C_r)$  الدائرة التي مركزها  $O$

وشعاعها  $r$  .

أ. بين أن :  $M(z) \in (C_r) \Leftrightarrow (\exists \theta \in [0, 2\pi]) / z = re^{i\theta}$   
 ب. بين أن صورة الدائرة  $(C_r)$  بالتطبيق  $f$  توجد ضمن مخروطي  $(E_r)$  يجب تحديد معادلة مختصرة له , ثم استنتج أن  $(E_r)$  إهليلج  
 بورتاه  $F(1)$  و  $F'(-1)$  .

3. لتكن  $M(z)$  نقطة من  $(E_r)$  و  $M'(z')$  نقطة من المستوى  $\rho$   
 بحيث :  $z'^2 + z^2 = 1$  .  
 أ. بين أن :  $OM'^2 = MF \times MF'$

( لا حظ أن :  $z'^2 = (1-z)(1+z)$  )

ب. استنتج أن :  $2\arg(z') \equiv \arg(1-z) + \arg(-1-z) + \pi [2\pi]$   
 ج. استنتج أن نصف المستقيم  $[OM')$  عمودي على منصف الزاوية الموجهة  $(\overline{MF}, \overline{MF'})$  .

د. بين أن :  $(MF + MF')^2 = 2(|z|^2 + |z'|^2 + 1)$

ثم استنتج أن النقطة  $M'(z')$  تنتمي إلى الإهليلج  $(E_r)$  .

أحسب بدلالة  $r$  المجموع :  $|z|^2 + |z'|^2$  .

### التمرين 25 :

أ. حل المعادلة  $z \in \mathbb{C} : z^2 + (1+i)z + 2i = 0$

نعتبر التطبيق  $P$  حيث :  $P(z) = z^3 + 2 - 2i$

أحسب  $P(1+i)$  واستنتج تعميلال  $P(z)$  ثم أعط؛ على شكلهما

الجبري ؛ حلي المعادلة  $z \in \mathbb{C} : P(z) = 0$  .

ب. أعط على شكل مثلثي الجذور المكعبة للعدد العقدي  $-2 + 2i$

ج. استنتج مما سبق  $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$  و  $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$  .

2. أ. أثبت أنه توجد ثلاث متتاليات هندسية  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  للأعداد العقدية

بحيث  $u_6 = 2 + 2i$  و  $u_3 = -i$  (أحسب الأساس  $q$  و الحد

الأول  $u_0$  لكل متتالية من المتتاليات المحصل عليها )

ب. لتكن  $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$  المتتالية العقدية المعرفة بما يلي :

$$\begin{cases} z_0 = \frac{1}{4}(-1+i) \\ z_{n+1} = (1+i)z_n ; n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

✓ أحسب  $z_n$  بدلالة  $n$  .

✓ أكتب  $z_n$  على شكل مثلثي .

✓ حدد قيم العدد الصحيح  $n$  لكي يكون  $z_n$  حقيقيا .

### التمرين 26 :

1. أ. أحسب  $(3 + \sqrt{3}i)^2$  .

ب. حل في  $\mathbb{C}$  المعادلة :

$$Z^2 + 2(1 - \sqrt{3}i)Z - 8(1 + \sqrt{3}i) = 0$$

2. نرمز بالأعداد  $z_1$  و  $z_2$  و  $z_3$  و  $z_4$  لحلول المعادلة :

$$(E) : z \in \mathbb{C}, z^4 + 2(1 - \sqrt{3}i)z^2 - 8(1 + \sqrt{3}i) = 0$$

أ. أكتب على الشكل الجبري حلول المعادلة  $(E)$  .

ب. أحسب  $z_1^6$  و  $z_2^6$  و  $z_3^6$  و  $z_4^6$  .

3. أ. أحسب  $(\sqrt{3} - i)^3$  و  $(-8i)^2$  .

ب. حدد على الشكل الجبري حلول المعادلة :

$$z \in \mathbb{C} : z^6 + 64 = 0$$

التمرين 27 : لكل عدد عقدي  $z$  مخالف للعدد -1 ؛ نضع :

$$f(z) = \frac{iz - 1}{(z + 1)^2}$$

1. أ. حدد العدد الحقيقي  $y$  بحيث :  $f(iy) = iy$  .

ب. حل في  $\mathbb{C}$  المعادلة :  $f(z) = z$  :  $(E)$  .

نرمز ب  $z_0$  و  $z_1$  و  $z_2$  لحلول المعادلة  $(E)$  حيث :

$$\Re(z_1) > \Re(z_2) \quad \text{و} \quad \Re(z_0) = 0$$

2. أ. تحقق أن :  $z_1 + 1 = e^{i\frac{11\pi}{6}}$  و  $z_2 + 1 = e^{i\frac{7\pi}{6}}$  .

ب. استنتج الكتابة المتثلثية لكل من العددين  $z_1$  و  $z_2$  .

3. في هذا السؤال نفترض أن  $z = e^{i\alpha}$  حيث  $0 \leq \alpha < \pi$  .

أ. بين أن :  $f(z) = izf(z)$  .

ب. حدد  $\alpha$  إذا علمت أن :  $f(z) + \overline{f(z)} = 0$  .

ج. أكتب  $f(z)$  على الشكل  $re^{i\varphi}$  حيث :

$$(r, \varphi) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$$

4. حدد  $z$  إذا علمت أن :  $\begin{cases} |z| = 1 \\ \Re(f(z)) = \frac{1}{2} \end{cases}$

التمرين 28 : في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد منظم

$(O, \vec{i}, \vec{j})$  ؛ نعتبر المنحنى  $(C_m)$  الذي معادلته هي :

$$\frac{x^2}{10-m} + \frac{y^2}{2-m} = 1 ; m \in \mathbb{R} \setminus \{2, 10\}$$

I. 1. ناقش حسب قيم  $m$  ؛ طبيعة المنحنى  $(C_m)$  .

2. إذا كان  $(C_m)$  مخروطيا ؛ أعط عناصره المميزة .

(المركز ؛ البورتان ؛ المقاربان إن وجدا )

3. أرسم  $(C_1)$  .

II. نعتبر في مجموعة الأعداد العقدية  $\mathbb{C}$  المعادلة ذات المجهول  $z$  :

$$(E) : z^2 - (6\cos(\alpha))z + 1 + 8\cos^2(\alpha) = 0$$

حيث :  $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$  .

1. حل في  $\mathbb{C}$  المعادلة  $(E)$  .

لتكن  $z_1$  و  $z_2$  حلي المعادلة  $(E)$  و  $(\Im m(z_1) > 0)$  و  $M_1$  و  $M_2$

النقطتين ذات اللحين  $z_1$  و  $z_2$  على التوالي .

2. أ. تحقق أن :  $M_1 \in (C_1)$  .

ب. بين أنه توجد نقطتان  $P_1$  و  $P_2$  من  $(C_1)$  حيث يكون فيهما

المماس للمنحنى  $(C_1)$  مولزيا للمستقيم  $(OM_1)$  .

ج. تحقق أن :  $OM_1^2 + OP_1^2 = OM_2^2 + OP_2^2$  .

